

Осторожно! Грызуны!!!



Грызуны являются переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний. На территории Республики Беларусь наибольшее распространение имеют серая (пасюк) и черная крысы, среди мышей чаще встречаются: обыкновенная (домовая) мышь, полевая мышь, обыкновенная полевка.

У **серых крыс** развито стремление жить ближе к грунту, они прокапывают гнезда под фундаментом, кучами отбросов. Излюбленными местами их поселения служат сырые подвалы, подполья, первые этажи домов. В современных домах они могут обитать в пустотных блоках панельных домов, канализационных устройствах. Пути перемещения и расселения их по застроенным территориям населенного пункта являются технические

коммуникации, теплоцентрали, канализационная система. Серые крысы хорошо преодолевают различные препятствия, свободно перемещаются по негладким поверхностям, прыгают вверх до 70 см и выше. Избегают человека. В случае отсутствия пищи и опасности могут нападать на животных, больных и беспомощных людей. Серой крысе присуще поедание в стае более слабых и больных особей. Пищевой рацион серых крыс различный. Серые крысы очень плодовиты и в благополучных условиях размножаются в больших количествах.

Черные крысы для поселения отыскивает сухие места, живут в верхних этажах зданий, на чердаках деревянных строений. Часто встречается в хлебных элеваторах, складах. Контакт черной крысы с человеком более тесен. Они проявляют активность не только ночью, но и днем. Черные крысы предпочитают растительную пищу (зерно, мука, плоды, овощи). Размножаются медленнее, чем пасюки.

Домовые мыши встречаются всюду, где только поселяется человек. В населенных пунктах поселяются преимущественно в жилище человека, а также в сараях, складских и подсобных помещениях. Могут жить в мебели, старых вещах, пространствах внутри стен и многих других местах. В помещениях, где поселились мыши, может присутствовать специфический запах, присущий их моче. Домовые мыши предпочитают сухие корма (крупы, хлеб), в открытых стациях питаются в основном зерном. В летнее время размножаются интенсивнее, чем зимой.

УНИЧТОЖЕНИЕ ГРЫЗУНОВ –

истребительные **дератизационные мероприятия проводятся** с целью сокращения численности или полного уничтожения грызунов **следующими методами**: физическим, химическим и в отдельных случаях биологическим. Физический метод дератизации – отлов, уничтожение или отпугивание грызунов при помощи приспособлений, механизмов и устройств. К физическому методу относятся следующие способы дератизации: механический, акустический (ультразвуковой). При механическом способе применяются механические орудия лова. Акустический способ дератизации – использование ультразвуковых колебаний для отпугивания грызунов. Указанный способ не вызывает гибели, грызуны быстро привыкают к ультразвуковым сигналам. Применяется этот способ совместно с другими методами и способами. Биологический метод дератизации предусматривает использование естественных биологических врагов грызунов (хищников). Химический метод – уничтожение грызунов при помощи ядов – родентицидов (ратицидов), является ведущим.

Места размещения приманки и ее расход зависят от стадии обитания грызунов и их численности. Приманку размещают в местах, где обнаружены следы жизнедеятельности грызунов (погрызы, помет): на путях перемещения, вдоль стен, перегородок, возле нор. Раскладывать приманку в сухих местах под укрытиями (шкафами, оборудованием и пр.) в приспособленных емкостях (приманочные ящики, дренажные трубы, лотки, коробки и пр.) или в специальных контейнерах. Последнее предпочтительнее, т.к. повышают поедаемость средства, препятствуя его растаскиванию грызунами, а также усложняют доступ к приманке нецелевым видам животных. Расстояние между точками раскладки приманки 2-15 м в зависимости от численности грызунов. Поскольку количество приманки для мышей меньше, чем для крыс, ее раскладывают чаще, размещая по всему объему помещений. Разложенную приманку осматривают первые 1-2 дня после раскладки, а затем с интервалом в 1 неделю. Съеденные порции заменяют на новые, а нетронутые крысами или мышами более недели перекадывают в другие места, посещаемые грызунами. Загрязненную или испорченную приманку меняют на новую. Работу ведут до исчезновения грызунов. Приманка может быть оставлена на более длительный срок в тех местах,

которые благоприятны для обитания и перемещения грызунов или для того, чтобы, предотвратить заселение объектов в периоды ожидаемого подъема численности. В этом случае наблюдения необходимо проводить не реже 2 раз в месяц.

САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ –

направлены на предупреждение развития грызунов, сокращения количества мест, пригодных для обитания и размножения, а также предупреждение заноса и расселения грызунов в помещениях и зданиях. **Для повышения эффективности борьбы с грызунами необходимо:**

избегать захламленности подвалов; регулярно вывозить мусор; осуществлять отдельный сбор твердых бытовых и пищевых отходов; правильно эксплуатировать мусоропроводы;

регулярно проводить санитарную очистку территории, своевременно освобождать от зарослей травы и неорганизованных свалок.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ –

родентицидные средства необходимо использовать в строгом соответствии с инструкциями/методическими указаниями в установленном порядке для каждого средства, с соблюдением правил личной и коммунальной гигиены, существующих правил охраны труда и техники безопасности.

При проведении всех видов работ с родентицидными средствами следует обязательно соблюдать правила личной гигиены. Запрещено пить, курить и принимать пищу в обрабатываемом помещении. Отравленные приманки на объекте раскладывают при помощи металлической или пластиковой ложки. Запрещается даже на короткое время оставлять без присмотра отравленные приманки в комнате, во дворе, в саду, огороде, поле, в открытой посуде.

После окончания работы все остатки просыпанных ядов тщательно собирают и уничтожают. Испортившиеся приманки, оставшиеся не съеденными грызунами, должны быть собраны и утилизированы, с учетом требований санитарного законодательства. Приманки с антикоагулянтами, разложенные в лотках, ящиках, трубках, могут находиться на объектах постоянно при условии регулярного контроля и соблюдения мер безопасности.

Работа осуществляется в спецодежде, защитной обуви, перчатках, при необходимости с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз. Во время работы не допускается курить, пить и принимать пищу. После работы следует вымыть с мылом руки, лицо и другие открытые участки тела, на которые могло попасть средство, прополоскать рот водой. По окончании рабочего дня следует принять гигиенический душ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ –

при любой степени отравления любым средством пострадавшему оказывается первая доврачебная помощь по принципу само- или взаимопомощи. При появлении признаков отравления во время выполнения работы (насморк, першение в горле, сухой кашель, общая слабость, озноб, тошнота, рвота, понос, обморок, судороги и пр.), пострадавшего следует немедленно отстранить от контакта с родентицидом, освободить от загрязненной одежды, средств индивидуальной защиты, вывести из опасной зоны. При случайном загрязнении средством санитарной одежды, кожи необходимо: немедленно снять спецодежду в непромокаемый (пластиковый, полиэтиленовый) мешок, после чего снять перчатки загрязненной поверхностью вовнутрь; видимые капли препарата на коже смыть под струей проточной воды, затем вымыть повторно под проточной водой с мылом. При попадании любого средства в глаза необходимо немедленно обильно промыть их под струей чистой проточной воды в течение 5-10 минут. При раздражении глаз – закапать 20-30 % раствор сульфацил натрия. При раздражении горла необходимо прополоскать его 2 % раствором питьевой соды или сделать содовые ингаляции. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды (2-4 стакана), а затем вызвать рвоту, раздражением корня языка. Эту процедуру можно повторить 2 раза. Через 10-15 минут после промывания желудка необходимо дать выпить пострадавшему активированного угля (10 таблеток) или полифепан, белосорб 2-4 столовые ложки.

Ни в коем случае не вызывать рвоту и не вводить ничего в рот человеку потерявшему сознание!

При попадании в желудок родентицидов (активно действующее вещество антикоагулянт) необходимо для нейтрализации яда принять 1-2 таблетки викасола.



Информацию по интересующим Вас вопросам можно получить в отделении профилактической дезинфекции Барановичского зонального ЦГиЭ по адресу: **г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а, каб. № 1, тел. 8 (0163) 46 40 62, электронная почта opdbar@tut.by**